



- » Průběžně kontrolujeme ovoce uložené ve sklepě. Scvrklá či plesnivá jablka včas vyhazujeme a průběžně zpracováváme dozrávající plody.
- » Ošetřujeme pukliny, mrazové desky a okousané kmeny a větve stromů, které vznikly během letošní zimy. Poškozené části kmenů i větví očistíme od odumřelého pletiva a rány zatřeme štěpařským voskem nebo stromovým balzámem.
- » Jakmile to půdní podmínky dovolí, provádíme jarní výsadbu prostokořených stromků a keřů, sázíme zejména meruňky a broskvoně.
- » Na začátku měsíce je nejvyšší čas na odběr roubů jaderovin. Po odběru rouby založíme do písku na pozdější přeroubování.
- » Po jarní či podzimní výsadbě provádíme výchovný řez podle požadovaného pěstitelského tvaru.
- » Přihnojujeme stromy rohovinou, která je přirozeným zdrojem pomalu rozpustného dusíku.
- » Koncem měsíce můžeme začít s roubováním či přeroubováním peckovin. Při roubování je vhodné, aby podnož již byla napučená, zatímco rouby ještě nenarašené. Podle síly podnože a roubu volíme metodu roubování.
- » Je nejvhodnější doba na zimní řez jaderovin, neboť již nehrozí větší mrazy. Při pravidelném řezu vždy respektujeme pěstitelský tvar, aktuální zdravotní stav stromu a dodržujeme základní zásady řezu stromů
- » Při řezu ovocných stromů můžeme vhodné výhony vyvazovat či ohýbat do požadovaného tvaru. Tento způsob tvarování používáme zejména u stíhlých větven nebo ovocných stěn. K zafixování výhonu používáme buď vinařský drátek, různé typy závaží, rozpěrek apod.
- » Prokypříme příkmenné pásy a obnovíme závlahové mísy u kmenů stromů. Během kultivace můžeme do půdy zapravit vyžrálý kompost či průmyslové granulované hnojivo.
- » Záhony jahodníku po zimě očistíme. Rostliny vytažené mrazem zatlačíme zpět do půdy. Při odstraňování zaschlých a nemocných listů z jahodníků dáváme pozor na centrální srdíčko. Po vyčištění rostlin záhon přihnojíme vyžrálým kompostem.
- » Výživu révy vinné je možné zlepšovat také zeleným hnojením. ZH je možné vysévat již v březnu. Volíme rychleji rostoucí druhy, jako jsou hořčice bílá nebo ředkev olejná.

Březnová ovocná zahrada

Zahrada se již pomalu začíná probouzet. Je to doba plná očekávání, radosti a taky spousty práce, jež nás na zahradě čeká. Je rovněž období nevyzpytatelného počasí, kdy jeden den může být 15 °C a druhý den nám ovocná zahrada na 14 dní zapadá sněhem. Nastane-li příznivé počasí na práci, tak dlouho neotálíme a věnujeme se nezbytným zahradním pracím. Co nestihneme udělat během března, v dubnu nedoženeme.

PŘI JARNÍM ŘEZU OSTRUŽINÍKU NENECHÁVÁME U ZEMĚ ČÍPKY

Při řezu ostružiníku zásadně odstraňujeme všechny odpložené výhony až u země a v žádném případě nenecháváme nad zemí krátké čípky, které by stejně uschly. Dále během jarního řezu vystřiháváme všechny slabé a zahušťující výhony. V keři by po řezu mělo zůstat (podle odrůdy a stáří keře) 5 až 8 zdravých silných výhonů. Ty můžeme následně zkrátit o 1/4 až 1/3. Postranní výhony zakracujeme asi na 20 cm. Podpoříme tím lepší rozvětvení a bohatší kvetení. Před (a) a po (b) řezu



ZDRAVÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM JE ZÁKLAD

Při jarním nákupu ovocných stromků a keřů raději zajdeme do specializovaného zahradního centra či ovocné školky, kde si můžeme sazenice osobně prohlédnout. Při výběru stromku se zaměříme hlavně na kořenovou a kmenovou část, neboť ty převážně rozhodují, zda se nám stromek na novém stanovišti ujme. Zejména si povšimneme, v jakém stavu jsou vlastní kořeny, které by měly být pěkné, zdravé, nepoškozené, s kořínky nezlámanými a neseschlými. Přihlédneme k jejich celkovému množství i k rozložení kořenů. Kmínek stromku by měl být neseschlý, nepoškozený a kůra hladká, rovná a neodřená. Rány po odstranění obrostu a čípku podnože by měly být s okrajovým závailem.



ŠTĚPKA Z VĚTVÍ JE CENNOU SUROVINOU

Při průklestu ovocných stromů vzniká na zahradě velké množství odřezaných větví, jejichž přímé pálení mnohdy není možné. Trendem, a jistě dobrým, je tuto odřezanou biomasu zpracovávat přímo na zahradě pomocí zahradního drtiče či štěpkovače. Výslednou štěpkou je možné po uschnutí topit či použít jako mulč pod keře rybízů, angreštů nebo do malin či ostružin.



VLNOVNÍK RYBÍZOVÝ – ROZTOČ POŠKOZUJÍCÍ PUPENY

Vlnovník rybízový se nejčastěji projevuje na černém rybízu tvorbou velkých kulovitých pupenů, které bývají nejviditelnější během rašení. Tento roztoč napadá i červený rybíz a angrešt, ale jejich přítomnost nebývá tak ukázková, jako u černého rybízu. Nejsnadněji se roztoče zbavíme odstrižením poškozené části výhonu, případně použijeme biologickou ochranu v podobě dravého roztoče.

HLOUBKA VÝSADBY STROMKU JE DŮLEŽITÁ

Při výsadbě nového prostokořenného stromku dbáme na to, aby místo štepování zůstalo 5 cm nad plánovanou výškou terénu. Toto ale neplatí u stromků, které jsou roubované v korunce. Ty vysazujeme zpravidla tak hluboko, jako se pěstovaly v ovocné školce. Na kořenovém krčku toto místo bývá dobře patrné. Bezprostředně po výsadbě provedeme výchovný řez korunky.



V BŘEZNU JE MOŽNÉ PŘIHNOJIT RÉVU

Vhodnější je využívání organických hnojiv. Nejpraktičtější je používání kompostu, protože kompost obsahuje celé spektrum makro a mikroprvků, které réva potřebuje. Lze ho mulčovat ve vrstvě přibližně 15 cm do příkmenného pásu. Mulčovaný kompost pozitivně působí na udržení vláh a také omezuje růst plevelů. Kompost je možné také v oblasti příkmenného pásu zarývat do půdy.

Do konce března je optimální čas pro ukončení zimního řezu révy. Po oteplení může následovat extrémní slzení, kdy réva ztrácí zásobní látky, které se nachází v míze. Později se provádí zimní řez pouze tehdy, když je záměrem oddálit rašení. Například v lokalitách s pravidelným výskytem jarních mrazů.

