



Únorová ovocná zahrada

- ## OV1- OCHRANA KMENE JE NEZBYTNOSTÍ





ÚNOR JE VHODNÝ ČAS NA ŘEZ RYBÍZU A ANGREŠTU.

Keře rybízu a angreštu potřebují každoroční pravidelné prostrhávání, jenž nám zajistí kvalitní úrodu a udržíme keře v dobré kondici a vitalitě. Větve u keřových tvarů zásadně vyřezáváme těsně u země a snažíme se vyvarovat čípků, které by následně stejně zaschly. U odrůd angreštu, které jsou náchylné na hnědé padlí angreštu, důsledně dbáme na zakracování konců jednoletých výhonů, na kterých tato houba přezimuje. A jak poznáme výhony napadené padlím? Napadené výhony mají charakteristické stříbřitě bělavé zbarvení, zatím co zdravé výhony jsou skořicově hnědé.



ODSTRAŇOVÁNÍ MUMIFIKOVANÝCH PLODŮ

Na ovocných stromech je v koruně během zimního období dobře vidět, kde zůstaly ponechané monilií napadené mumifikované plody. Sebrané mumifikované plody nejčastěji zlikvidujeme zkompostováním, spálením nebo vhozením do popelnice. Odstraněním takovýchto plodů omezíme výskyt této choroby v nadcházející sezoně.



NEJLEPŠÍ HNOJIVO JE KOMPOST

Není-li příliš zima a půda není zamrzlá, tak přihnojujeme ovocné stromy a keře dobře vyvrátlým a prosátým kompostem. Prokátovaný kompost v přiměřené vrstvě nasypeme na zem v okapové linii okolo keřů, opatrně a mělce ho zapravíme. Při jeho zapravování se snažíme motýčkou nepoškodit kořeny. Vyvrátlý kompost nejvíce ocení mělce kořenící dřeviny, jako jsou rybíz a angrešt a dále stromky na slabě rostoucích podnožích.

GUYOTŮV ŘEZ

Při zimním řezu révy vinné se často využívá Guyotův řez na čípek a tažeň. Zásobní čípek je umístěn vždy blíže ke kořenům révy než tažeň. Na zásobním čípku se ponechávají pouze dvě očka. Větší počet oček by vedl k zahuštění keře.



ZKRÁCENÍ JEDNOLETÉHO DŘEVA RÉVY

Při zimním řezu zůstává na keři jednoleté dřevo, které se upravuje na různou délku do podoby čípků (2 očka), krátkých tažňů (2–4 očka), polotažňů (4–8 oček) nebo tažňů (více než 8 oček). Čípky se nejčastěji využívají u kordonových tvarů (a) nebo jako již zmíněné zásobní čípky. Čípky jsou méně vhodné pro stolní odrůdy, protože na prvních očkách bývají založené menší hrozny i bobule. Pokud se pěstitel rozhodne u stolní odrůdy pro kordonový tvar, může nechat na čípcích i tři očka, jak ukazuje obrázek. U vrcholových tvarů, z nichž nejpoužívanější je rýnsko-hessenské vedení, se nejčastěji využívají polotažně nebo tažně. (b) ukazuje tvar s dvěma polotažni, před řezem.

