



- » Při předpovědi nízkých teplot, především v období „ledových mužů“, postříkáme stromy během mrazivé noci jemnou mlhou, která na větvích udělá ledovou krustu a pomůže zmírnit poškození mrazem.
- » Pokud jsme to v dubnu nestihli, případně nacházíme-li se ve vyšších polohách, dokončíme přeroubování stromů zdravými nenarašenými rouby. Podle šířky podnože a rouby volíme metodu štěpování.
- » Začínáme s řezem vlašských ořešáků. Vhodná doba pro jeho řez nastává, pokud jsou letorosty již dlouhé 6 až 12 cm. V případě, že by však rány ještě „slezy“, tak řez posuneme o 14 dní.
- » Podrůstající podnože po vyrašení co nejdříve v místě jejího obrůstání odstraňujeme. Mezi nejvíce podrůstající podnož patří myrobalán, který se ve školkařské praxi používá jako podnož pro slivoně a meruňky a meruzalka zlatá, která slouží za podnož pro stromkový rybíz a angrešt.
- » Velmi silné a konkurenční výhony co nejdříve odřezáváme. Nesnažíme se je zkracovat ani vyvazovat, neboť mají velmi silný růst a narušovaly by budoucí rovnováhu v koruně.
- » Vyvazujeme postranní výhony u štihlých větven a stěnových tvarů do „podvodroviny“. Vyvázáním omezíme jejich růst a urychlíme nástup do plodnosti.
- » Vydatně zaléváme při dlouhodobém suchu. Primárně důkladně zaléváme nově vysazené stromky, mělce kořenící dřeviny, jahodník a kvetoucí či dokvétající stromy. Závlahovou dávku u automatické závlahy upravujeme podle aktuální potřeby rostlin.
- » U přeroubovaných a zmlazených stromů vylamujeme během měsíce „vlky“, které vyrostly pod místem roubování nebo po odstranění silnější větve.
- » Na nejmladších částech letorostů pravidelně a pečlivě sledujeme výskyt mšic, které na nich nejraději sají. Jelikož mšice patří mezi nejčastější přenašeče virových chorob, jejich přítomnost vhodným způsobem včas regulujeme.



V květnu ovocná zahrada kvete a zahrádkáři mají na zahradě nejvíce práce. Je-li průběh měsíce teplý a deštivý, vše velmi intenzivně roste a dá se předpokládat dobrá úroda. Letorosty na stromech intenzivně narůstají, peckoviny již bývají zpravidla odkvetlé a nově vzniklé plůdky jsou předzvěstí pěkné sklizně. Během měsíce již v nižších polohách dozrávají kamčatské borůvky a ke konci měsíce nejranější odrůdy třešní.

PŘEDIVKA JABLOŇOVÁ - „ŠKŮDCE“ NEOŠETŘOVANÝCH STROMŮ

S předivkou jabloňovou se starostliví zahrádkáři příliš nesetkají, protože při jarním ošetření stromů insekticidními přípravky zahubí i jejich prezimující housenky. Samičky tohoto motýlka kladou v létě vajíčka, z nichž se ještě před zimou vylíhnou larvy. Na jaře larvy vyvírají pupeny a později vytvářejí husté zápředky, ve kterých ožírají listové čepele až na centrální žilku. Při velkém výskytu mohou způsobit holožir. Nejčastěji škodí na jabloních, výjimečně bývá na hrušních, aróniích či hlozích.



VRTULE TŘEŠŇOVÁ = ČERVIVOST TŘEŠNÍ

Zavěšování žlutých lepových desek do korun třešní nám slouží k signalizaci výskytu vrtule třešňové, která způsobuje známou červivost třešní. K částečnému odchytu vrtule poslouží vyvěšení 3–4 lepových desek na velikost koruny do 2 metrů, do 6 metrů pak stačí 5–7 desek. Jako další omezení červivosti pomůže důkladné sbírání všech plodů i těch na zem spadlých, neboť se larvy v plodech vyvíjejí zpravidla tři týdny. Poté vypaďávají na zem, kde se kuklí. Rané odrůdy třešní netrpí červivostí, jelikož uzrají dříve, než dojde k jejich napadení.



KVETOUČÍ ROUBY

U přeroubovaných stromů se může stát, že nejsou všechny pupeny na roubech listové, ale některé jsou květní. Jestliže se stane, že se nám na roubech objeví květy, tak je opatrně špičkou ostrého nože odstraníme. Ponecháním květů bychom rouby příliš vysilovaly a mohlo by se stát, že by se neujaly.



ZIMOLEZ KAMČATSKÝ JE PRVNÍ OVOCE NA ZAHRADĚ

Bobule tohoto nenáročného keře dozrávají již brzy na jaře. Jeho plody jsou skryté pod listy v keřích a často tak ujdou naší pozornosti. Má malé, protáhlé, tmavomodré až modrosivé bobule s vysokou nutriční hodnotou. Tyto bobule rády vyhledávají děti, neboť to bývá první ovoce ze zahrady. Hodí se jak pro přímý konzum, tak se různě kuchyňsky zpracovává.



PROBÍRKA PLŮDKŮ U PECKOVIN

S ruční probírkou plůdků u peckovin začínáme až po přirozeném propadu plodů. Ze stromů odebíráme slabě se vyvíjející plody, plody mechanicky poškozené či namrzlé. Po probírce by plody neměly být ve shlucích a měly by být v celém prostoru koruny rovnoměrně rozložené.

PRVNÍ PŘÍZNAKY PADLÍ RÉVY

V případě teplého a suchého počasí po rašení révy vinné je vhodné ošetřit proti padlí révy, které přezimuje v zimních očkách. Příznivé podmínky mohou způsobit infekci již po rašení, během období růstu letorostů. Pro toto ošetření je vhodné využití přípravků na bázi síry.



NEVYVÁZANÝ TAŽEŇ JE PREVENČE PROTI JARNÍM MRAZŮM

Během května mohou pozdní jarní mrazy způsobit poškození révy. V místech, kde se jarní mrazy vyskytují pravidelněji, je vhodné ponechat nevyvázaný tažeň. Rašení oček na vrcholové části tažně zpomaluje rašení oček na bazální části tažně. Tato oka potom mohou přežít jarní mrazy bez poškození. Poté, co pomine riziko jarních mrazů, se tažeň vyváže k drátence.

Martin Makal, Pavel Pavloušek a Shutterstock, foto autoři



RÉVOVÝ KEŘE PŘED PODLOMEM

V květnu také začínají zelené práce u révy. Po přechodu rizika jarních mrazů se provádí podlom. Je založený na redukci počtu letorostů, které vyraší ze zimního oka. Potenciálně mohou vyrašit až tři letorosty. Jelikož by byla listová stěna zahuštěná, odstraňují se některé letorosty. Podlommem je třeba docílit rovnoměrné rozmístění letorostů na tažni.

» Sklízíme dozrávající první odrůdy raných třešní, jež uzrávají koncem měsíce. Nejčastěji to bývá RYCHLICE, KAREŠOVA, ADÉLKA, RIVAN nebo KAŠTÁNKA. Tyto rané odrůdy nebyvají napadány vrtulí třešňovou, jako některé pozdější odrůdy třešní a višní.

» Udržujeme v bezplevelném stavu záhony jahodníku. Jahodník má velmi mělký kořenový systém, proto nekypříme půdu motýčkou, ale jen rukou vytrháváme plevel