



- » U na jaře přeroubovaných stromů kontrolujeme ujmoutí roubů a vylamujeme nepotřebné letorosty. Roubovací pásku povolujeme až tehdy, jestliže jsou rouby dobře přirostlé.
- » Vylamujeme, případně odřezáváme zahušťující letorosty – „vlky“, které rostou v koruně nebo na horních stranách větví a výhonů. Letorosty rostoucí v požadovaném směru nezakracujeme, nýbrž je ponecháme ve své původní délce.
- » Velmi bujně a konkurenční letorosty se nesnažíme zkracovat či vyvazovat, ale rovnou je odstraníme. Jejich příliš bujný růst by narušoval rovnováhu v koruně.
- » Ještě nezdřevnatělé delší letorosty vyvazujeme pomocí vlnařského drátku do žádoucí polohy. K nasměrování či k vyklonění letorostu do požadovaného směru lze použít různé typy závaží, rozpěrek či kolíčků.
- » Během sklizně třešní je možné řezem zmenšit velké koruny. Větve „sesazujeme“ na vhodné rozvětvení. Při řezu třešně respektujeme metodu Zahnova řezu. Odřezané větve i s plody opatrně spouštíme na zem, kde je pohodlně očeseme.
- » S probírkou plůdků začneme až po jejich přirozeném fyziologickém propadu. Při probírce špatně vyvinutých, poškozených, nevhodných či nadbytečných plůdků dáváme pozor; abychom ponechané plůdky během probírky nepoškodili, a aby na plodonoši zůstala spolu se žádoucím plodem i stopka po odstranění plůdku.
- » Udržovací řez ořešáku provádíme zásadně v průběhu vegetace. V případě, že v květnu přišel mrazík a letorosty namrzly, počkáme s řezem až do jejich znovuobnovení. Při vysokých teplotách řez raději odložíme, neboť nově vzniklé rány by zasychaly a špatně by se hojily.
- » Podle aktuálního vývoje počasí, a jestliže je delší doba sucho, vydatně zaléváme. Lepší je to méně často, ale zato důkladně.
- » Pravidelně sledujeme výskyt chorob a škůdců. Na jádrovinách zasahujeme hlavně proti padlí a strupovitosti, dále proti mšicím, vlnatce a obaleči. U peckovin nám může úrodu znehodnotit vrtule třešňová a různé druhy pilatek,

Červnová ovocná zahrada

Nastalo období, kdy jsou nejen na zahradě dny nejdelší, ale také, kdy nám zahrada přináší první plody naší práce. Během teplých dní postupně dozrávají jednotlivé odrůdy třešní a nejranější odrůdy višní. Na záhonech s jahodníky vystlaných slámou průběžně uzrávají jahody. Bujný růst letorostů je velkým lákadlem pro různé patogenní organismy, které nám mohou výrazně oslabit růst stromů či znehodnotit budoucí sklizeň.

SKVRNY NA LISTECH JABLONÍ

Bílé až světle zelené skvrny různého tvaru na listech jabloní, ale i třešní, višní či slivoní není zvláštní pupenová mutace jako panašování listů, ale jedná se o virovou mozaiku jabloně. Velmi silně poškozené listy tímto virem se deformují a skvrny nekrotizují. Toto virové onemocnění způsobuje u citlivých odrůd snížení kvality a výnosu až o třetinu.



- u slivoní pak poslední dobou též tmavka švestková. I u peckovin škodí mšice, a to nejen samotným sáním na letorostech, ale rovněž přenosem virů. Na všechny patogeny používáme k jejich regulaci doporučené ochranné prostředky.
- » Sklízíme odrůdy třešní, jež postupně dozrávají, jmenovitě například KASANDRA, RIVAN, BURLAT, KAREŠOVA a JACINTA. A také rané odrůdy višní, jež dozrávají koncem měsíce.
- » Nejčastěji v dopoledních hodinách a probírkou sklízíme zralé jahody. V průběhu sklizně zároveň co nejdříve odstraňujeme plody napadené plísňí šedou.

- » U révy se dělají především zelené práce a ochrana proti houbovým chorobám.
- » Po odkvětu se může také odlišovat zóna hroznů. Dostatečné je odstranění zálistků a 1–2 listů v zóně hroznů, aby do zóny hroznů dopadalo rozptýlené sluneční záření.
- » V případě, že letorosty přerůstají drátěnku, je třeba je zakrátit – osečkovat.
- » Před a po odkvětu révy jsou listy, květenství a hrozny nejcitlivější k houbovým chorobám. Proto se dělá ošetření proti houbovým chorobám pomocí fungicidů nebo ekologických přípravků.



TŘEŠEŇ LZE PĚSTOVAT I V NÁDOBÁCH

Ač se to nezdá, tak při vhodné kombinaci slabě rostoucí podnože a rané odrůdy třešně, je možné s určitým úspěchem pěstovat třešně v nádobách. Jistě není to nic nového, neboť o tomto způsobu pěstování se v zahradnické literatuře již psalo před sto lety.

UPEVNĚNÍ LETOROSTŮ

Velmi důležité je včasné upevnění rostoucích letorostů do drátěnky. Pro dobré upevnění je vhodná drátěnka se třemi dvojdrátími. Při upevňování letorostů do drátěnky je dobré je také v drátěnce rozmístit, aby nebyl keř hustý.



CHOROBY RÉVY

Deštivé a teplé počasí je příznivé pro rozvoj plísně révy a naopak suché a teplé počasí, s vyšší vzdušnou vlhkostí je příznivé pro rozvoj padlí révy (na snímku). Ochranu je však třeba preventivně provést před kvetením i po odkvětu, proti oběma houbovým chorobám.

MŠICE TŘEŠŇOVÁ DOKÁŽE VÝRAZNĚ OSLABIT STROM

S mšicí třešňovou se nejčastěji setkáme v období začátku zrání třešní, kdy je nejvíce vidět v korunách stromů. Tento druh mšice nejraději saje na listech, letorostech, ale i stopkách plodů. Po jejím napadení přestávají letorosty růst, zakrňují, chřadnou a později částečně zasychají. Letorosty jimi poškozené pro svou zdeformovanost se nehodí pro další tvarování korun, obzvláště platí u mladých stromků.



JAHOODY RÁDY LEŽÍ NA SLÁMĚ

Nejvhodnější dobou pro nastýlání slámou u jahodníků bývá období květu či těsně po odkvětu. Sláma pod rostlinami pomůže tomu, aby se vyvíjející se plody nedostaly do styku s půdou. Jahody se takto nezašpiní od půdy při zálivce nebo dešti a nejsou tolik náchylné na hniloby, jako kdyby ležely přímo na zemi. Mulčování slámou dokáže snížit odpar z půdy a omezit zaplevelení záhonu.



PODRŮSTAJÍCÍ PODNOŽ

Typ použité podnože výrazně ovlivňuje intenzitu vegetativního růstu naštěpované odrůdy. Často se stává, že u některých vegetativně množených podnoží nám tato podnož pravidelně obrůstá u kmene. Takto podrůstající výmladky podnože je nutné co nejdříve po jejím objevení odstranit.

Marrtin Makal, Pavel Pavloušek
Foto autoři a Shutterstock